

	Cholique hépatique	Cholécystite aigue	Angiocholite aigue
Définition	= Petits calculs dans la VB passant dans les voies biliaires et finissant dans le duodénum	= calcul bloquant la bile dans la vesicule biliaire et entrainant une infection	= calcul bloquant la bile dans la voie biliaire principale
Mécanisme d'apparition	<ul style="list-style-type: none"> - Dans la VB : petits ou gros calculs - Quand elle se contracte elle les libère - Se bloquent à différents endroits - Irrite les voies biliaires lors de la migration. - 	<ul style="list-style-type: none"> - lithiase (95 %) - alithiase 	
Symptômes	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Douleur <ul style="list-style-type: none"> - dure moins de 6h, en HD (sous le foie) - irradie dans le dos et épaule D ▪ Nausées ▪ Vomissements ▪ Apyrétique ▪ Signe de Murphy <ul style="list-style-type: none"> - Palpation HD : douleur empêchant inspiration profonde 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Douleur <ul style="list-style-type: none"> - Pas de rémission, en HD ▪ Fièvre 38-38,5 = fièvre d'organe ▪ Défense en HD = syndrome de Murphy ▪ Sub ictère ▪ Iléus fonctionnel 	Triade de charcot <ul style="list-style-type: none"> ▪ Douleur en HD ▪ Fièvre a 40 ▪ Ictère cholestatique
Examen	Biologique Echographie	Biologie Echographie	Biologique Echographie Bili IRM Scanner
Traitement	A domicile <ul style="list-style-type: none"> - Antispasmodique - Antalgique - Diete hydrique - Cholecystectomie 	Chirurgie <ul style="list-style-type: none"> - Antalgique - Antibiotiques - Cholecystectomie 	<ul style="list-style-type: none"> - Sphincterotomie on coupe la papille par gastroscopie) - Voie per cutané - Antalgique - Antibiotheraphie - Cholecystectomie

Complications	<ul style="list-style-type: none"> - Reste bloqué dans canal biliaire : tension, stagnation infection - Reste bloqué dans papille : angiocholite - Reste bloqué dans choledoque : cholecystite - Stagnation de la bile (juste avant infection) : Hydrocholecyste - Passe en plus de 6h dans les voies biliaires principales : Migration lithisaique - Calcule dans le choledoque mais avec passage de la bile : calcul du choledoque - Calcule bloquant cystique et voie biliaire : syndrome de mirizzi - Pancréatite aigue 	<ul style="list-style-type: none"> - Péritonite biliaire : explosion de la vésicule avec libération de la bile infectée - Plastron vésiculaire - Iléus biliaire (=occlusion du grêle) - Angiocholite aigue 	
Autres	<ul style="list-style-type: none"> - Fréquent - 20 % de la population - Pas toujours symptomatique - 2 types différents : <ul style="list-style-type: none"> o Cholesterolique : augmentation du cholestérol et stagnation o Pigmentaire : différentes couleurs - Pas de gravité mais risque de crise de cholique hépatique (=récidive) 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 formes <ul style="list-style-type: none"> o Catarrhale o Suppuré o Gangréné - 3 grades (critères de Tokyo) <ul style="list-style-type: none"> o faible o modéré o Grave → défiance d'organe 	
Diagnostiques différentiels	<ul style="list-style-type: none"> - Pancréatite aigue - Infarctus - Pathologie rénale 	<ul style="list-style-type: none"> - Appendicite sous hépatique - Piélonéphrite aigue - Pneumopathie basale droite - Péri-hépatique 	